


Fiche informative client - Fluides sous-cutanée (avec seringues)

PRÉPARATION

- Rassemblez tout votre matériel et retirez les articles de leur emballage;
- Prenez le sac de fluides et désinfectez le port beige avec de l'alcool isopropylique;
- Fixez l'aiguille en la vissant à la seringue et insérez-la dans le port du sac. Tirez sur le piston jusqu'à l'obtention du volume désiré;
- Une fois les fluides prélevés, remplacez l'aiguille par l'aiguille papillon. Fixez-la à l'extrémité de la seringue en la vissant;
- Poussez le piston pour remplir le tube de l'aiguille papillon.

Matériel:

1. Sac de fluides
2. Seringue
3. Aiguille papillon
4. Aiguille
5. Port beige



Balayer pour
visionner la vidéo
(préparation):



COMMENT ADMINISTRER LES FLUIDES

- Choisissez un endroit où la peau est souple et facile à soulever, par exemple entre les épaules;
- Soulevez la peau pour créer une « tente »;
- N'insérez jamais l'aiguille en angle. L'aiguille doit être alignée parallèlement au dos de l'animal;
- Insérez complètement l'aiguille papillon sous la peau, avec le biseau (le petit trou) orienté vers le haut;
- Une fois l'aiguille sous la peau, vérifiez son bon positionnement en tirant doucement sur le piston de la seringue. Vous devriez sentir une légère résistance:
 - Si de l'air entre dans la seringue, c'est probablement que l'aiguille a traversé le pli de peau (ce qui est l'objectif);
 - Si du sang apparaît (très rare), retirez simplement l'aiguille et recommencez les étapes ci-dessus dans une nouvelle zone;
- Une fois le bon positionnement confirmé, injectez lentement le liquide;
- Une bosse de liquide se formera sous la peau. Si vous remarquez que la bosse devient ferme pendant l'injection, retirez l'aiguille et administrez le reste des fluides dans une autre zone;
- Après l'injection, retirez l'aiguille tout en pinçant la peau. Une légère fuite de liquide ou un peu de sang au site d'injection est normale et non préoccupante;
- La bosse de liquide s'absorbera graduellement, diminuant considérablement dans l'heure qui suit. Vous pouvez masser la bosse pour aider à disperser les fluides sous la peau et soulager la tension.

Balayer pour
visionner la vidéo
(administration):



SÉCURITÉ & GESTION DES AIGUILLES

Les aiguilles sont généralement conçues pour un usage unique. Si elles sont réutilisées pour des raisons budgétaires, assurez-vous qu'elles soient rebouchées, entreposées de la manière stérile, et manipulées avec prudence. Jetez les aiguilles dans un contenant pour objets tranchants biomédicaux ou rappez-les à une pharmacie ou une clinique vétérinaire.




N.B. Ne jetez jamais les aiguilles à la poubelle ou au recyclage.

Fiche informative client - Fluide sous-cutanée (avec tubulure)

PRÉPARATION

- Commencez par rassembler votre matériel et retirez les articles de leur emballage;
- Placez le sac de fluides à l'envers et retirez le bouchon bleu du port du sac. Insérez le perforateur dans ce port d'entrée;
- Fixez l'aiguille à l'extrémité de la tubulure en la vissant;
- Suspendez le sac de fluides en hauteur et laissez la tubulure se remplir de fluide (assurez-vous qu'aucune pince n'est fermée);
- Une fois que la tubulure est entièrement remplie, fermez une pince pour empêcher le liquide de continuer à s'écouler.



Matériel:

1. Sac de fluides
2. Tubulure
3. Aiguille
4. Bouchon bleu du port
5. Perforateur

Montage complet:



ADMINISTRATION DES FLUIDES

- Trouvez une zone avec de la peau loose (ex.: entre les omoplates);
- Soulevez la peau pour créer une forme de « tente »;
- N'insérez jamais l'aiguille en angle. L'aiguille doit être alignée parallèlement au dos de l'animal;
- Insérez l'aiguille avec le biseau (le petit trou) orienté vers le haut;
- Une fois le bon positionnement, ouvrez les pinces de la tubulure pour laisser couler les fluides;
- Une bosse de liquide se formera sous la peau;
- Si vous remarquez que la bosse devient ferme pendant l'injection, retirez l'aiguille et administrez le reste des fluides dans une autre zone;
- Après l'injection, retirez l'aiguille tout en pinçant la peau. Une légère fuite de liquide ou un peu de sang au site d'injection est normale et non préoccupante;
- La bosse de liquide s'absorbera graduellement, diminuant considérablement dans l'heure qui suit. Vous pouvez masser la bosse pour aider à disperser les fluides sous la peau et soulager la tension.

Balayer pour
visionner la vidéo
(préparation &
administration):



SÉCURITÉ & GESTION DES AIGUILLES

Les aiguilles sont généralement conçues pour un usage unique. Si elles sont réutilisées pour des raisons budgétaires, assurez-vous qu'elles soient rebouchées, entreposées de manière stérile, et manipulées avec prudence. Jetez les aiguilles dans un contenant pour objets tranchants biomédicaux ou rapportez-les à une pharmacie ou une clinique vétérinaire.

N.B. Ne jetez jamais les aiguilles à la poubelle ou au recyclage.